


4 - Carta della vegetazione potenziale



- VEGETAZIONE POTENZIALE**
- Oleo-Ceratonion: macchia sempreverde con dominanza di olivastro e carrubo
 - Quercion ilicis: macchia e foresta sempreverde con dominanza di leccio
 - Quercetalia pubescentis-petraeae: formazioni forestali di querce caducifoglie termofile con dominanza di roverella s.l.
 - Quercetalia pubescentis-petraeae: formazioni forestali di querce caducifoglie mesofile con dominanza di cerro
 - Geranio striati-Fagion: formazioni forestali con dominanza di faggio
 - Rumici-Astragalealia: aggruppamenti altomontani ad arbusti nani con dominanza di astragal siciliano
 - Aree a potenzialità ridottissima
 - Populetalia albae, Nerio-Tamaricetalia, ecc.: vegetazione alveo ripariale
- STAZIONI RILEVATE**
(Tomaselli et al., 1968)
- Ceratonietum, Oleo-Leniscetum
 - Quercetum leucostomum sicili
 - Quercetum pubescentis s.l.
 - Quercetum pubescentis "cerretosum"
 - Aquifolio-Fagetum
 - Stazioni a Platanus orientalis
- STAZIONI PARTICOLARI**
- Cp: Cyperus papyrus
 - Fe: Fraxinus excelsior
 - Ps: Poterium spinosum
 - Qca: Quercus calliprinos
 - Qi: Quercus ilex
 - Qp: Quercus pubescens s.l.
 - Qs: Quercus suber
 - St: Stipa tortilis
 - Uc: Urtica campestris